

Nannophryne variegata

Sapo variegado, sapito de tres rayas
Eden Harbour Toad, Patagonian Toad

Reglamento de clasificación de especies silvestres (MMA):
Preocupación menor
Regiones VIII-XII
No endémica de Chile, originaria de Chile y Argentina

Ley de caza, Chile (*Bufo variegatus*):
Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio;
Especie catalogada como benéfica para la **mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales**;
Aysén: especie catalogada como Fuera de Peligro.

Ministerio del Medio Ambiente, Chile:
Se verifica destrucción y degradación del bosque nativo circunscrito a zonas restringidas. Sin embargo, **no existen datos concretos para la zona de distribución sur**.
Propuesta clasificación: concluye que según los criterios de la UICN (versión 3.1) vigentes en Chile, su Categoría de Conservación es: **Casi Amenazada** ;
Dado que: La especie no satisface los criterios de UICN para ser clasificada en alguna de las categorías siguientes En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próxima a satisfacerlos.

Ficha de antecedentes de especie: http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas6proceso/fichas2010/Nannophrynevariegata_Bufovariegatus_P06R5_RCE.pdf

Sinónimos:

Bufo trivittatus Philippi, 1902
Bufo variegatus (Günther, 1870)
Bufo variegatus (Günther, 1870)
Nannophryne variegatus (Günther, 1870)

Lista Roja UICN 2014: Preocupación Menor; tendencia de la población - estable.
Listado como Preocupación Menor en vista de su relativamente amplia área de distribución, su presumiblemente gran población, y porque probablemente la no hay una declinación para calificar en una categoría más amenazada.
Tendencias de población - estable. Una especie localmente abundante. Reportado abundante en 2002 en la Isla Wellington, Chile. En Argentina es más común en el sur del país.

Especie **endémica de los bosques australes de Chile** (vertiente occidental de los Andes desde 39 ° S a 51 ° S) y Argentina, desde Shangrila (37 ° S) hasta 53 ° S en el archipiélago fueguino. **El anfibio más austral del mundo, junto con *Batrachyla antartandica***. Su rango altitudinal oscila entre 0-2.000 m snm (norte de la Patagonia, Argentina).

Hábitats: **humedales continentales**, bosques, tundra / praderas.
Su hábitat se encuentra en bosques húmedos de templadas a fríos, pantanos, y la tundra magallánica. Ocurre en los pantanos, bajo troncos en la región de la selva de *Nothofagus*, así como la tundra rodeada de *Nothofagus* de baja estatura en la región subantártica. Se reproduce en lagunas temporales superficiales y pantanos. Tolerancia algunas interferencias.

Amenazas: No amenazado por la mayor parte. La destrucción del hábitat y la degradación (pérdida de bosque nativo) es una amenaza localizada.

Magellanic Subpolar Forests Habitat and Amphibian Associates:

http://eol.org/data_objects/26553040

“Thirteen amphibians are found in the ecoregion, all of whom are anuran taxa. Some species of amphibians are characteristic of the ecoregion including the Patagonian Toad (**Nannophryne variegata**); Marbled Wood Frog (**Batrachyla antartandica**), found from Mehuin to the Virtudes Islands; ... Gray Four-eyed Frog (**Pleurodema bufoninum**), occurring in the Patagonian steppe and subpolar forests; ... Banded Wood Frog (**Batrachyla taeniata**), found from Neuquen Province to the lower Rio Negro Province; Chiloe Island Ground Frog (**Eupsophus calcaratus**), found from Valdivia to Wellington Island in Puerto Eden, Chile to Tromen Lake and Puelo Lake in Argentina;...”